

Physarum robustum

Lieu : St-Aubin-du-Perron (50)

Date : 10/09/24

Récolte et identification : Florent Boittin

Confirmation : Bernard Woerly


Réf. herbier FB : MYX-115



Sporocarpe : 1 à 1,5 mm de haut. Un nombre non négligeable de sporocarpes possèdent 2 à 3 sporocystes réunis en haut du stipe. Par exemple les 6 qui apparaissent les plus nets sur la photo, c'est à dire à gauche, sont fixés 2 par 2 sur 3 stipes.


Sporocystes : subglobuleux à hémisphérique, surface externe du périidium recouverte de particules calcaire blanches sauf à la base qui est brune autour du stipe.

Stipe : brun, égal ou plus long que le diamètre du sporocyste.
Sans calcaire interne.






Stipe


Pseudocolumelle : blanche, facilement détachable, formée par un capillitium badhamioïde.




Capillitium : physaroïde à tendance badhamioïde, s'épaississant vers la base et formant une pseudocolumelle.







Spores : libres, (10) 11 - 12 µm, verruqueuses avec des groupes de verrues plus foncées.



Support : bois mort de feuillus (chêne ou châtaignier)

Biotope : bocage, chemin pédestre

Répartition géographique : 14 observations localisées dans le sud-est de la France d'après l'INPN et 272 enregistrements géoréférencés au niveau mondial d'après le GBIF.