

Physarum squamosum

Lieu : Bois l'Abbé – Forêt de Cerisy (50)

Date : 02.12.2024

Récolte et identification : Florent Boittin

Confirmation : Carlos Lado

Réf. herbier FB : MYX-139






Sporocarpes : mesurant 0,4 mm de haut, stipités

Sporocyste : globuleux à subglobuleux, grisâtre recouvert d'écailles arrondies blanchâtres à la marge, orange plus ou moins pâle au centre.

Stipe : noir, mesurant un peu moins de la moitié de la hauteur totale

Péridium : gris-bleu, alterné d'épaisses écailles calcaires

Écailles du péridium : calcaires, blanches tachées de brunâtre




Capillitium : plutôt badhamioïde, constitué de nœuds calcaires plus ou moins pâles, grands et de formes irrégulières.






Granules calcaires vert jaunâtres.



Spores : globuleuses, 9-10 μm de diamètre, finement et densément spinuleuses



Spores x 1000

Support : mousses, en compagnie de *Diderma chondrioderma*

Biotope : forêt de feuillus, hêtre principalement mais aussi quelques chênes

Répartition géographique : nouvelle pour la France, cette espèce est géoréférencées 18 fois au niveau mondial sur le GBIF.

Florent BOITTIN